

URDU

The Royal Liverpool and
Broadgreen University Hospitals
NHS Trust



دی رائل لیورپول

اینڈ

براڈگرین

یونیورسٹی

ہاسپٹلز

این ایچ ایس ٹرسٹ

نایٹسینن (آرفاڈن®)

2mg سخت کیپسولز کے

Better
Together

Patient information

Nitisinone (Orfadin®) 2mg Hard Capsules

Pharmacy and Clinical Chemistry Directorates

PIF 1601 V3

اہم معلومات - برائے مہربانی ذیل کو غور سے پڑھیں

یہ دوا لینے سے پہلے اس کتابچے کو مکمل طور پر غور سے پڑھ لیں

- اس کتابچے کو سنبھال کر رکھیں کیونکہ آپ کو اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
- اگر آپ کو مزید سوال پوچھنے ہوں تو اپنے کنسلٹنٹ یا فارمیٹ سے بات کریں۔
- یہ دوا آپ کیلئے ہے۔ اپنی دوا کسی اور کے ساتھ کبھی مت بانٹیں۔ اس کے باوجود بھی کہ انہیں بھی آپ جیسی بیماری لاحق ہو، یہ دوا انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔
- اگر اس دوا کے کوئی درج شدہ مضر اثرات آپ کیلئے باعث تکلیف بن جائیں یا کوئی ایسے مضر اثرات آپ محسوس کریں جن کا مریض کیلئے اس معلوماتی کتابچے میں ذکر نہیں ہے تو برائے مہربانی اپنے کنسلٹنٹ یا فارمیٹ کو اس کی اطلاع دیں۔

ٹائٹینن کیا ہے اور اسے کس مقصد کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے؟

ٹائٹینن کو ایک ایسی بہت کم جینیٹک بیماری کے علاج کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جسے الکھونڈیوریا یا اے کے یو کہتے ہیں۔ یہ بیماری پیدائشی ہوتی ہے۔ اے کے یو ایک اینزائم یعنی خامرہ کی کمی کی وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم موجود ہوموجینیٹک ایسڈ (Homogentisic acid) یا ایچ جی اے نام کی ایک شے کو توڑ نہیں پاتا ہے۔ جب ایچ جی اے جسم میں جمع ہو جاتی ہے تو اس سے اے کے یو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، جو آپ کیلئے باعث تکلیف بن سکتی ہیں۔ مثلاً:

- شدید حد تک ریڑھ کی ہڈیوں اور دیگر بڑے جوڑوں کا درد
- دل کے ویلو کا نقصان
- گردوں، بڑی آنت، مثانہ اور رال بنانے والے غدودوں میں پتھری پیدا ہو جانا
- نسون، پٹھوں اور رباطات کا پھٹ جانا، یعنی ان میں بگاڑ پیدا ہونا یا ان کا ٹوٹ جانا

- ہڈیوں کا ٹوٹ جانا
- سماعت کے مسائل
- گردوں کا نقصان

نائٹیمین اس اینزائم کو روکتی ہے جو ایچ جی اے کو کام کرنے سے روکتا ہے۔ اس سے ایچ جی اے جمع ہونے سے اور نقصان پہنچانے سے رک جاتا ہے۔

جسم اس وقت ایچ جی اے بناتا ہے جب آپ پروٹین کھاتے ہیں، خصوصاً ٹائروسین (Tyrosine) اور فینیل لانیٹن (Phenylalanine)۔ یہ ضروری ہے کہ جس دوران آپ نائٹیمین لے رہے ہیں، اس دوران آپ خصوصی قسم کی خوراک استعمال کریں جس میں ان چیزوں کی کمی ہو۔ اگر آپ نے ایسی خوراک اور مشروبات کا سلسلہ جاری رکھا جن میں یہ اشیاء شامل ہیں تو آپ کے خون میں ٹائروسین کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں آپ کی آنکھوں، جلد اور رگوں کے مرکزی نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

آپ کا کنسلٹنٹ اور ریا ماہر خوراک آپ کے ساتھ آپ کی خوراک کی تبدیلی کے حوالہ سے بات چیت کرے گا۔ ماہر خوراک آپ کو خصوصی کھانوں سے پرہیز کے حوالہ سے اور خوراک کے منصوبہ پر عمل کرنے کے متعلق مزید معلومات مہیا کرے گا۔

نائٹیمین کیپسول لینے سے پہلے آپ کو جن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے

اگر آپ کو نائٹیمین سے یا نائٹیمین کیپسول کی جڑوی چیزوں سے الرجی ہے تو آپ کو نائٹیمین کیپسول استعمال نہیں کرنا چاہئیں۔ ایسی صورت میں اس دوا کے استعمال سے پہلے اپنے کنسلٹنٹ یا فارمسٹ سے بات کریں۔

اگر آپ عرصہ دراز سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں، خصوصاً آنکھوں کے مسائل (مثلاً، آنکھوں کا درد، لال آنکھیں یا آنکھوں میں سوجن، اگر آپ کی آنکھیں عام حالات سے بڑھ کر روشنی سے حساس ہیں یا آپ کو آنکھوں کا کوئی اور مسئلہ ہو جیسے معنیہ

بند یا کورنیا کا السر) تو اس دوا کو لینے سے پہلے اپنے کنسلٹنٹ یا فارمسٹ کو ضرور بتائیں۔ یہ علاج شروع کرنے سے پہلے ممکن ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا پڑے۔

آپ کا کنسلٹنٹ آپ کو باقاعدہ ملاقاتوں کا مشورہ دے گا تا کہ نائٹیمین کے ذریعہ علاج کے دوران وہ آپ کے جگر کی نقل و حرکت اور خون کی گنتی پر نظر رکھ سکے۔

دیگر ادویات

ممکن ہے کہ آپ نائٹیمین ساتھ میل بول کھانے والی دیگر ادویات بھی لے رہے ہوں۔ اگر آپ فی الوقت کوئی دیگر دوا لے رہے ہیں یا حال ہی میں لے چکے ہیں، چاہے پری سکرپشن کے ساتھ یا اس کے بغیر جیسے کوئی ہربل دوا یا وٹامنز، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ کو ان کے بارے میں بتائیں۔

تمام دوائیں جو آپ لے رہے ہیں یا ماضی میں لے چکے ہیں، ان کی ایک فہرست اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ کی کسی دوا میں کمی بیشی آتی ہے یا اگر آپ کوئی دوا لینا شروع یا بند کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر یا فارمسٹ کو اس کے متعلق بتائیں تاکہ یہ بات یقینی بنائی جاسکے کہ اس دوا کا نائٹیمین پر کوئی اثر تو نہیں پڑ رہا ہے۔

حل اور بچے کو اپنا دودھ پلانا:

اگر آپ نائٹیمین لے رہی ہیں اور حاملہ ہیں یا حاملہ ہو جائیں یا بچے کو اپنا دودھ پلانا چاہتی ہیں تو نائٹیمین لینے سے پہلے آپ کو اپنے کنسلٹنٹ یا فارمسٹ کو اس کے متعلق بتانا چاہیے۔

مہارتوں والے کام کرتے وقت (مثلاً گاڑی یا کوئی مشین چلانا):

نائٹیمین لیتے دوران اگر آپ کو بینائی کے کوئی مسائل درپیش ہوں تو گاڑی یا کوئی مشین چلانے سے پہلے آپ کو اپنے کنسلٹنٹ یا فارمسٹ سے مشورہ حاصل کرنا چاہیے۔

نائٹسمن کپچول کیسے استعمال کی جانی چاہئیں

نائٹسمن کی گولیوں کو ہمیشہ بالکل اُسی طریقہ سے استعمال کریں جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کو طریقہ کار صحیح سے معلوم نہ ہو تو اپنے کنسلٹنٹ یا فارمسٹ سے بات کریں۔

دوا لینے کا طریقہ کار

نائٹسمن کپچول کھانے کے ساتھ منہ کے ذریعہ لیا جانا چاہیے۔

مقدار

نائٹسمن کی عام مقدار روزانہ ایکٹ کپچول ہے۔ یہ مقدار ہر روز ایکٹ ہی وقت پر لیں۔ اس دوا سے بہترین مفاد کیلئے ضروری ہے کہ آپ اسے باقاعدگی کے ساتھ لیں۔

اگر آپ نائٹسمن لینا بھول جائیں تو

جوں ہی آپ کو یاد آئے، فوراً ہی وہ کپچول لے لیں جو آپ لینا بھول گئے تھے۔ اگر آپ کی اگلی کپچول لینے کا وقت قریب ہے تو جو کپچول آپ لینا بھول گئے تھے اسے مت لیں۔ اس کی بجائے ہدایت کے مطابق اگلا کپچول لے لیں۔

اگر آپ ایک وقت کی دوا لینا بھول گئے تھے تو اس کی دُگنی مقدار میں دوا مت لیں۔

اُس صورت میں کیا کرنا چاہیے جب آپ نے حد سے زیادہ مقدار میں نائٹسمن کپچول لے لئے ہوں۔

اگر آپ نے حد سے زیادہ گولیاں کھالی ہیں یا کسی اور نے آپ کی دوا کھالی ہے تو فوری طور پر کسی ڈاکٹر کو بتائیں یا اپنے قریب ترین ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ (اے اینڈ ای ڈیپارٹمنٹ) میں جائیں۔ بچی ہوئی دوا یا غالی ڈبیہ اپنے ڈاکٹر دکھائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بذات خود یا کسی ڈاکٹر کے ذریعہ لیورپول میں واقع نیشنل الیکٹرونوریا سینٹر (این اے سی) سے مشورہ حاصل کریں۔

ہائیمین کے ممکنہ مضر اثرات

ہر دوا کی طرح ہائیمین کے بھی مضر اثرات ہو سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس سے متاثر ہو۔

کچھ مضر اثرات خوراک کے منصوبہ پر صحیح طرح سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور ان کھانوں یا مشروبات سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے پیش آسکتے ہیں جن سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔

فکر مت کریں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مضر اثرات پیش آسکتے ہیں لیکن بہت ہی کم موقعوں پر۔

فوراً ہی ہائیمین لینا بند کر دیں اور کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کو ذیل کے کوئی مضر اثرات درپیش ہوں تو ممکن ہے کہ آپ کو فوری طبی علاج کی ضرورت پڑے: فوری طور پر اپنے قریب ترین ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ جائیں۔

- کوئی الرجک ردِ عمل (غارش یا جلد پر پھنسیاں، چہرے یا ہاتھوں پر سوجن، منہ اور گلے میں بے چینی یا سوجن، سینے میں تنگی محسوس کرنا یا سانس لینے میں دقت)
- کالا، تارکول کے رنگ جیسا یا خون سے بھرا فضلہ

- گہرے رنگ کا پیشاب یا بھیجے رنگ کا فضلہ
- شدید پیاس یا گرم، خشک جلد
- بینائی کے مسائل، یا آنکھوں کا روشنی میں زیادہ حساس ہو جانا
- آنکھوں کا لال ہو جانا، دکھنا، درد، پھول جانا یا تکلیف میں مبتلا ہو جانا
- پیٹ میں اچانک درد، قبض، قے آنا
- غیر معمولی طور پر خون بہنا، نیل پڑ جانا یا کمزوری
- آنکھوں یا جلد کا پیلا پڑ جانا

دیگر، کم شدت کے مضر اثرات کا پیش آنا زیادہ ممکن ہے۔ نائسیمین کا استعمال جاری رکھیں اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مضر اثرات پیش آئیں تو اپنے کنسلٹنٹ یا فارمسٹ سے بات کریں:

- بخار، گلے میں غارش، کھانسی اور بھٹوں میں درد
- جلد پر کھجلی، جھلکے بننا یا جلد کا پھل جانا یا سوزش
- جلاب آنا، متلی ہونا، قے آنا یا قبض
- بے چینی یا تھکاوٹ
- آپ کی ماہواری میں تبدیلی
- پیاس
- پیٹ میں ہلکا سا درد
- دھیان دینے میں مشکلات اور یادداشت کے مسائل

اگر اس فہرست میں شامل کوئی بھی مضر اثرات آپ کو شدت سے پیش آئیں یا اس فہرست کے علاوہ کوئی ایسے اثرات آپ کو پریشان کر رہے ہوں تو اپنے کنسلٹنٹ یا فارمسٹ سے بات کریں۔

ناٹیسین کپچولز کو کیسے سنبھال کر رکھیں

ناٹیسین کپچولز کو بچوں کی پہنچ اور نظر سے دور رکھیں۔

ناٹیسین کپچولز کو ریفریجریٹر (2-8°C کے درمیان) میں رکھیں۔ ناٹیسین کپچولز کو ان کے اصلی ڈبوں یا پیکٹ میں ہی رکھیں تاکہ یہ کپچولز روشنی سے محفوظ رہیں۔

لیبل پر درج شدہ دوا، دوا کے ناکارہ ہو جانے والی تاریخ کے بعد استعمال مت کریں۔ یہ تاریخ اس ماہ کے آخری دن کی تاریخ ہے جس کے بعد آپ کو یہ دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ دوا کو گھر کے کچرا والے ڈبہ میں یا ٹائلٹ یا پانی کے کسی ناہ میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ غیر استعمال شدہ کپچولز کو کسی فارمیسی میں لے جائیں۔

ناٹیسین کپچولز کیا ہیں؟

اس دوا میں اہم جزو ناٹیسین ہے۔ دوسرے جزو پر پی جیلٹائنز ڈسٹارچ (مکئی) (Pregelatinised starch (maize))،

جیلینین (Gelatin)، ناٹینیم ڈائی آکسائیڈ (Titanium Dioxide (E171))، بلیک آئرن آکسائیڈ (Black iron oxide)

((E172))، شیلک (Shellac) اور پراپولین گلائی کول (Propylene glycol) ہیں۔

اشیاء کی لائسنس کے حوالہ سے حیثیت:

ناٹیسین کو صرف ایک دوسری بیماری کیلئے لائسنس ملا ہے جس کا نام ہے ہریڈٹری ٹائروسین مینیا ٹائپ-1

(Tyrosinemia type-1)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کے یو کے اندر ناٹیسین کا استعمال بلا لائسنس ہے۔ اس کا

مطلب یہ نہیں کہ نائٹینن کا استعمال غیر محفوظ ہے۔ آپ کا کنسلٹنٹ کلینک کے اندر آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دے گا اور نائٹینن کا نسخہ آپ کو دینے سے پہلے اس کے فوائد اور نقصانات سے آپ کو آگاہ کر دے گا۔

اس کتابچے میں دی گئی معلومات کا تعلق صرف اے کے یو کے اندر نائٹینن کیپسولز کے استعمال سے ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا اگر آپ کسی بات کے متعلق غیر یقینی ہیں تو اپنے کنسلٹنٹ یا فارمسٹ سے بات کریں۔

اگر آپ کو مزید معلومات یا مشورہ درکار ہو تو کس سے رابطہ کریں

اگر آپ کے ذہن میں کوئی مزید سوالات ہوں تو برائے مہربانی ہم سے رابطہ کریں۔ نیشنل الکھونڈیوریا سینٹر (این اے سی) میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور صحت کے دیگر ماہرین کے پاس طبی تجربہ اور صحت کے ماہرین کیلئے مزید تحریری معلومات موجود ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔

مزید معلومات

ڈاکٹر ایل رنگاناتھ

**Dr L Ranganath,
Consultant in Clinical Biochemistry and Metabolic
Medicine; 0151 706 4197.**

ڈاکٹر ای مارکس

**Dr E Marks,
Consultant in Clinical Biochemistry and Metabolic
Medicine; 0151 706 4197.**

ڈاکٹری مشرا

Dr V Mishra,
Consultant in Clinical Biochemistry and Metabolic
Medicine; 0151 706 4197.

عام اوقات سے باہر 0151 706 2000 (سوئیچ بورڈ سے اوپر درج کنسلٹنٹس میں سے کسی
ایک کے بارے میں پوچھیں)

فارمیسیٹ

ادویات کے متعلق معلومات کیلئے میڈیسن انفارمیشن کو ذیل کے نمبر پر فون کریں:
0151-706-2096

Author: Pharmacy and Clinical Chemistry
Directorates
Review Date: June 2015

ٹرسٹ کی طرف سے منظور شدہ تمام معلومات درخواست کر پر دوسرے طریقوں سے جیسے مختلف زبانوں میں، ایڑی ریڈ (آسان زبان)، بڑے الفاظ کی لکھائی میں، آڈیو، بریل، مونس اور الیکٹرونک طریقہ سے دستیاب ہیں۔

يمكن توفير جميع المعلومات المتعلقة بالمرضى الموافق عليهم من قبل انتمان المستشفى عند الطلب بصيغ أخرى، بما في ذلك لغات أخرى وبطرق تسهل قراءتها وبالحروف الطباعة الكبيرة وبالصوت وبطريقة برايل للمكفوفين وبطريقة مون والكترونيا.

所有經信托基金批准的患者資訊均可以其它格式提供，包括其它語言、易讀閱讀軟件、大字

體、音頻、盲文、穆恩體 (Moon) 盲文和電子格式，敬請索取。

در صورت تمایل میتوانيد کلیه اطلاعات تصویب شده توسط اتحادیه در رابطه با بیماران را به اشکال مختلف در دسترس داشته باشید، از جمله به زبانهای دیگر، به زبان ساده، چاپ درشت، صوت، خط مخصوص کوران، مون و بصورت روی خطی موجود است.

زانیاری پیوندیدار یو نمخوشانهی له لایمن تراستهوه پسمند کراون، نهگمر داوا بکرنیت له فورماتمهکانی تردا بریتی له زمانهکانی تر، نیزی رید (هاسان خویندنهوه)، چاپی گموره، شریتی دمنگ، هیلی موون و نملیکترونیکی همیه.

所有经信托基金批准的患者信息均可以其它格式提供，包括其它语言、易读阅读软件、大字
体、音频、盲文、穆恩体 (Moon) 盲文和电子格式，敬请索取。

Dhammaan warbixinta bukaanleyda ee Ururka ee la oggol yahay waxaa marka la codsado lagu heli karaa nuskhado kale, sida luqado kale, akhris fudud, far waaweyn, dhegeysi, farta braille ee dadka indhaha la', Moon iyo nidaam eletaroonig ah.