

Patient information

أدوية لمرض التهاب الأمعاء فيدوليزوماب

مجموعة رعاية أمراض الجهاز الهضمي (Digestive Diseases Care Group)

لماذا تم إعطائي فيدوليزوماب؟

فيدوليزوماب هو عبارة عن دواء يُستخدم لعلاج مرض التهاب الأمعاء (IBD). ويمكن استخدامه مع المرضى الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي النشط باعتدال إلى النشط بشدة. كما يُعد أيضًا بمثابة أحد الخيارات للمرضى الذين يعانون من مرض كرون النشط باعتدال إلى النشط بشدة، والذين جربوا بالفعل نوعًا من أنواع العلاج يُدعى عامل نخر الورم (TNF)-مُثبِّط ألفا.

ما هو فيدوليزوماب؟

فيدوليزوماب هو دواء يتم إعطاؤه بداخل الأوردة. وهو يقلل من التهاب الأمعاء من خلال منع مرور أحد أنواع خلايا الدم البيضاء إلى جدار الأمعاء.

كم من الوقت سيستغرق الدواء حتى يظهر مفعوله؟

قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن ترى استجابة للعلاج. إذا لم يستجب مرض التهاب الأمعاء لدواء فيدوليزوماب بعد 14 أسبوعًا، فينبغي إيقافه.

ما هي فوائد تعاطي فيدوليزوماب؟

يمكن أن يكون فيدوليزوماب فعالاً في مكافحة أمراض التهاب الأمعاء ومنعك من الإصابة بنوبات متكررة من الأعراض.

ما هي الآثار الجانبية الشائعة؟

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا (التي تحدث في أكثر من مريض واحد من بين كل عشرة مرضى) التهاب بطانة الأنف والحلق، وهو يشبه قليلاً الإصابة بالبرد في الرأس. ويمكن أن تكون الآثار الجانبية الشائعة الأخرى هي الصداع وآلام المفاصل.

وتشمل الآثار الجانبية الأقل شيوعًا ارتفاع ضغط الدم، والشعور بالوخز، والطفح الجلدي، وضعف العضلات، وآلام الظهر، وغُسر الهضم، والتعب.

هل هناك علاجات بديلة متاحة؟

إذا ظهرت عليك آثار جانبية عند تعاطيك لدواء فيدوليزوماب، أو إذا لم تتم السيطرة على مرضك بشكل جيد، فسوف يقوم طبيبك المتخصص بمناقشة خيارات العلاج الممكنة الأخرى معك.

ماذا سيحدث إذا قررت عدم الخضوع للعلاج باستخدام دواء فيدوليزوماب؟

ستستمر الأعراض أو ستزداد سوءًا. وسيناقش طبيبك خيارات العلاج الأخرى معك. مستشفى ليفربول الملكي ومستشفى برودجرين

PIF 1906 V3

ما هي الجرعة التي يجب تعاطيها؟

في بداية العلاج، ستتلقى ثلاث جرعات من دواء فيدوليزوماب في فترة ستة أسابيع. بعد عملية الضخ الوريدي الأولى في العيادات الخارجية، سوف تتلقى عملية ضخ فيدوليزوماب الثانية بعد أسبوعين. ستتلقى فيدوليزوماب مرة أخرى بعد أربعة أسابيع أخرى. وستتلقى فيدوليزوماب بعد ذلك كل ثمانية أسابيع.

هل أستمّر في تناول العلاجات الأخرى لمرض التهاب الأمعاء؟

سيقوم طبيبك المتخصص بتوجيهك بما إذا كان يجب عليك تغيير علاجاتك الأخرى الخاصة بمرض التهاب الأمعاء أم لا.

هل أحتاج إلى أي فحوصات خاصة أثناء تعاطي فيدوليزوماب؟

ستتم مراقبة نشاط مرض التهاب الأمعاء لديك طوال فترة العلاج، ولكنك لن تكون بحاجة إلى فحوصات خاصة أثناء تلقي فيدوليزوماب.

هل يمكنني تعاطي أدوية أخرى جنباً إلى جنب مع فيدوليزوماب؟

نعم. يمكن تعاطي الأدوية الأخرى بأمان أثناء تلقيك العلاج باستخدام دواء فيدوليزوماب.

هل يؤثر فيدوليزوماب في الخصوبة والحمل؟ هل يمكنني القيام بالرضاعة الطبيعية أثناء تعاطي فيدوليزوماب؟

لا توجد معلومات كثيرة متاحة بشأن استخدام فيدوليزوماب في الحمل والرضاعة الطبيعية مع المريضات اللواتي يعانين من مرض التهاب الأمعاء.

إذا كنت تخططين للحمل، أو أصبحت حاملاً، فينبغي عليك مناقشة علاجك مع طبيب IBD. وقد تتم إحالتك إلى عيادتنا المتخصصة في مستشفى النساء في ليفربول من أجل مناقشة الأمور بمزيد من التفصيل. في هذه العيادة، سيتم الكشف عليك بواسطة خبير في مرض التهاب الأمعاء وطبيب توليد (طبيب متخصص في رعاية النساء الحوامل). وستتمكن من مناقشة خيارات العلاج معك بشكل فردي.

هل يمكنني تناول المشروبات الكحولية بينما أتعاطي فيدوليزوماب؟

نعم، من الآمن تناول المشروبات الكحولية أثناء تعاطي فيدوليزوماب، ومع ذلك، يجب تجنب تناول كميات كبيرة من المشروبات الكحولية.

هل يمكنني الحصول على اللقاحات أثناء تعاطي فيدوليزوماب؟

تُعد لقاحات البرد بمثابة لقاحات آمنة أثناء تعاطي فيدوليزوماب. إن لزم الأمر، فمن الأفضل إعطاء اللقاحات "الحية" مثل شلل الأطفال، وBCG (السل)، وMMR (الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية)، قبل بدء علاج فيدوليزوماب. ومع ذلك، إذا كنت قد بدأت بالفعل تعاطي فيدوليزوماب، ورأى طبيبك أنك ستستفيد من تلقيك أحد هذه اللقاحات، فيمكنك تلقي اللقاح أثناء الاستمرار في علاج فيدوليزوماب الخاص بك.

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول فيدوليزوماب؟

إذا كانت لديك أي أسئلة حول فيدوليزوماب، فاسأل طبيبك، أو ممرضة IBD المتخصصة، أو الصيدلي لديك.

مستشفى ليفربول الملكي ومستشفى برودجرين

PIF 1906 V3

هذه النشرة ليست بديلاً عن أي توجيه أو إرشاد قد يقدمه لك طبيبك، أو الممرضة، أو الصيدلي لديك.

الملاحظات

إن ملاحظاتك مهمة جداً بالنسبة إلينا وتساعدنا على تحسين الرعاية الصحية في المستقبل.

بعد خروجك من المستشفى أو حضورك في موعد العيادات الخارجية، ستتلقى رسالة نصية تسألك ما إذا كنت ستوصي بخدمتنا للآخرين أم لا. يُرجى أخذ الوقت الكافي للرد على الرسالة النصية، ولن يتم تحصيل رسوم منك مقابل الرسالة النصية، ويمكنك الإلغاء في أي وقت. نحن نقدر تعاونك بشدة.

معلومات إضافية

الممرضات المتخصصات في التهاب الأمعاء

موقع الويب: **crohnsandcolitis.org.uk/mersey**

المؤلف: مجموعة رعاية أمراض الجهاز الهضمي (**Digestive Diseases**)
(**Care Group**)
تاريخ المراجعة: أبريل 2023

All Trust approved information is available on request in alternative formats, including other languages, easy read, large print, audio, Braille, moon and electronically.

يمكن توفير جميع المعلومات المتعلقة بالمرضى الموافق عليهم من قبل ائتمان المستشفى عند الطلب بصيغ أخرى، بما في ذلك لغات أخرى وبطرق تسهيل قراءتها وبالحروف الطباعة الكبيرة وبالصوت وبطريقة برايل للمكفوفين وبطريقة مون والإلكترونيا.

所有經信托基金批准的患者資訊均可以其它格式提供，包括其它語言、易讀閱讀軟件、大字

體、音頻、盲文、穆恩體 (Moon) 盲文和電子格式，敬請索取。

در صورت تمایل میتوانيد کلیه اطلاعات تصویب شده توسط ائتلاف در رابطه با بیماران را به اشکال مختلف در دسترس داشته باشید، از جمله به زبانهای دیگر، به زبان ساده، چاپ درشت، صوت، خط مخصوص کوران، مون و بصورت روی خطی موجود است.

زانیاری پئوهئیدار بهو نهخوئنهه له لایهن تراستهوه پهساند کراون، نهگه داوا بکرنیت له فوره ماتمکائی تردا بریتی له زمانهکائی تر، نیزی رید (هاسان خوئندهوه)، چاپی گهوره، شریقی دهنگ، هیلی موون و ئهلیکترونیکی هیه.

所有经信托基金批准的患者信息均可以其它格式提供，包括其它语言、易读阅读软件、大字体、音频、盲文、穆恩体 (Moon) 盲文和电子格式，敬请索取。

Dhammaan warbixinta bukaanleyda ee Ururka ee la oggol yahay waxaa marka la codsado lagu heli karaa nuskhado kale, sida luqado kale, akhris fudud, far waaweyn, dhegeysi, farta braille ee dadka indhaha la', Moon iyo nidaam eletaroonig ah.