




*Better
Together*

Informações do paciente

Extrações dentárias sob anestesia local

Hospital Odontológico da Universidade de Liverpool

PIF 868 V5

O que envolve uma extração dentária?

Este é um procedimento de rotina e envolve a remoção de um dente usando fórceps dentários e outros instrumentos, como elevadores.

Que tipo de anestesia é usado?

O dente é extraído usando uma anestesia local. Esta é injetada na gengiva ou na área em redor do dente. A área demora alguns minutos a ficar anestesiada e isto significa que não sentirá qualquer dor enquanto a extração for realizada; no entanto, poderá sentir alguma pressão.

Como todos os medicamentos, as anestésias locais podem, por vezes, ter efeitos secundários, além dos efeitos necessários. Pode experienciar tonturas, visão turva, sonolência e, ocasionalmente, perda de consciência.

Efeitos secundários graves são raros e incluem convulsões, tensão arterial baixa, respiração lenta e alterações nos batimentos cardíacos, que podem ser fatais. Se tiver alguma dúvida sobre algum destes efeitos, discuta-os com o seu dentista.

O que posso esperar após a extração?

Pode ocorrer o seguinte:

- Desconforto após o desaparecimento da anestesia local. Este pode ser gerido com analgésicos.
- Um pouco de sangue a escorrer da cavidade.
- Um pequeno inchaço em redor da área da extração durante alguns dias.

Quais são os possíveis problemas?

A maioria das extrações trata-se de procedimentos simples, com poucas complicações ou problemas. Abaixo estão alguns dos problemas que podem ocorrer:

- Sangramento - este, geralmente, pode ser interrompido aplicando pressão sobre a área de extração durante pelo menos dez minutos com um lenço enrolado ou um cotonete. Ocasionalmente é necessário tapar a cavidade ou colocar uma sutura (ponto).
- Uma infecção localizada pode resultar na perda do coágulo sanguíneo na cavidade de extração - isto é conhecido como "alveolite seca". Uma "alveolite seca" pode ser bastante dolorosa, mas é autolimitada. Responde bem ao tratamento local - raramente são indicados antibióticos.
- Ocasionalmente, os dentes partem durante uma extração. O seu dentista dir-lhe-á se está particularmente em risco.
- Se o dente se partir, é possível que seja necessário um procedimento cirúrgico oral menor (MOS, Minor Oral Surgical). Serão fornecidas mais informações pelo dentista responsável pelo seu tratamento. (Ver também PIF 833 Remoção cirúrgica de dentes ou raízes.)
- Alguns dentes molares superiores podem estar próximos do seio maxilar. Ocasionalmente, isto pode originar complicações após a extração. O seu dentista explicará isto com mais detalhes se estiver particularmente em risco.

Existem tratamentos alternativos disponíveis?

Uma vez tomada a decisão de que o seu dente precisa de ser removido, não há qualquer tratamento alternativo. Se deixar o dente como está, os problemas continuarão.

O que acontecerá se decidir não fazer qualquer tratamento?

Qualquer dor de dentes que sinta continuará e poderá piorar. Se a raiz do dente ficar infetada, tal provocará dor e inchaço. Raramente ocorrem complicações graves como a infeção do osso da mandíbula (osteomielite) ou a formação de abscesso na face ou pescoço, mas estas podem ser fatais.

Feedback

Os seus comentários são importantes para nós e ajudam-nos a influenciar os cuidados prestados no futuro.

Após a sua alta do hospital ou a sua consulta ambulatorial, receberá uma mensagem a perguntar se recomendaria o nosso serviço a outras pessoas. Reserve algum tempo para nos responder. A mensagem não lhe será cobrada e poderá optar por não participar a qualquer momento. Agradecemos a sua cooperação.

Informações adicionais

Se tiver alguma dificuldade pós-operatória urgente a um sábado, domingo ou depois das 17:00 num dia da semana, entre em contacto com a linha de apoio do NHS telefonando para o 111.

Dependendo da sua situação, a equipa do NHS 111 pode colocá-lo em contacto com uma enfermeira, dentista de emergência ou até um médico de clínica

geral e pode marcar consultas presenciais se achar que precisa.

Números de contacto:

Departamento de Anestesia Local (Local Anaesthesia Department),

Hospital Odontológico da Universidade de Liverpool

Tel: 0151 706 5060

Número de telefone de texto: 18001 0151 706 5060

Fax: 0151 706 5807

NHS 111

Tel.: 111

Autor: Hospital Odontológico da Universidade de Liverpool

Data de revisão: Dezembro de 2021

Todas as informações aprovadas pelo Trust estão disponíveis mediante solicitação em formatos alternativos, incluindo outras línguas, leitura fácil, letras grandes, áudio, Braille, Moon e eletronicamente.

يمكن توفير جميع المعلومات المتعلقة بالمرضى الموافق عليهم من قبل انتمان المستشفى عند الطلب بصيغ أخرى، بما في ذلك لغات أخرى وبطرق تسهل قراءتها وبالحروف الطباعية الكبيرة وبالصوت وبطريقة برايل للمكفوفين وبطريقة مون والكترونياً.

所有經信托基金批准的患者資訊均可以其它格式提供，包括其它語言、易讀閱讀軟件、大字體、音頻、盲文、穆恩體 (Moon) 盲文和電子格式，敬請索取。

در صورت تمایل میتوانید کلیه اطلاعات تصویب شده توسط اتحادیه در رابطه با بیماران را به اشکال مختلف در دسترس داشته باشید، از جمله به زبانهای دیگر، به زبان ساده، چاپ درشت، صوت، خط مخصوص کوران، مون و بصورت روی خطی موجود است.

زانیاری پنیوهندیدار بهی نهخوشانهی له لایسن تراستهوه پهمند کراون، نهگمر داوا بکریت له فورماتهکانی تردا بریتی له زمانهکانی تر، نیزی رید (هاسان خونندنهوه)، چاپی گموره، شریتی دهنگ، هنیلی موون و نهلیکترونیکی همیه.

所有经信托基金批准的患者信息均可以其它格式提供，包括其它语言、易读阅读软件、大字体、音频、盲文、穆恩体（Moon）盲文和电子格式，敬请索取。

Dhammaan warbixinta bukaanleyda ee Ururka ee la oggol yahay waxaa marka la codsado lagu heli karaa nuskhado kale, sida luqado kale, akhris fudud, far waaweyn, dhegeysi, farta braille ee dadka indhaha la', Moon iyo nidaam eletaroonig ah.